

# BOROSAN Forte

BOROSAN Forte obsahuje bór, jehož zdrojem je kyselina boritá.

## Chemické a fyzikální vlastnosti

vlastnost	hodnota
Celkový bór jako B v %	11,0

## Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium 1,0, olovo 10, rtuť 1,0, arsen 10, chrom 50.

## Rozsah a způsob použití:

BOROSAN Forte je koncentrát boru určený k preventivnímu nebo kurativnímu odstraňování nedostatku využitelného boru v rostlinách. Při kurativní aplikaci formou postřiku na list odstraňuje fyziologické anomálie způsobené nedostatkem tohoto prvku. Preventivně se aplikuje do porostů na stanovištích s vysokým deficitem bóru. Preventivní aplikaci lze doporučit také u kultur náročných na dostatečné množství bóru. K takto náročným plodinám patří: řepka, mák, slunečnice, cukrová řepa, krmná řepa, zelenina, ovoce, okrasné rostliny.

## Příprava hnojiva a dávkování:

Nejvhodnější použití je začátkem vegetace po olistění kultur. Od této doby lze hnojivo aplikovat ve 14 denních intervalech minimálně 3x za sebou. V době kvetení hnojivo příznivě na prorůstání pylové láčky a tím i na tvorbu semen a plodů. BOROSAN Forte je možné aplikovat po celou dobu vegetace. Aplikuje se v dávkách 2-3 l koncentrátu na ha ve čtrnáctidenních intervalech.

Plodiny	Období aplikace	Dávkování v l/ha	Počet aplikací
řepka ozimá	po skončení zimy	3	1x
cukrovka	po dokončení tvorby listové růžice a v 15 denním intervalu	3	2x
jádroviny, peckoviny	1. aplikace při otevírání pupenů, 2. a 3. v intervalu 15 dnů	2	2 – 3x
zelenina	3 týdny po výsadbě, 2. aplikace po 4 týdnech	1	2x
vinná réva	1. aplikace při otevírání pupenů, 2. při kvetení a 3. při růstu plodů	3	3x
obilniny ozimé	po skončení zimy	2	1x

Pro aplikaci platí obecné zásady pro foliární výživu rostlin, tj. nejvhodnější doba pro aplikaci je za vyšší relativní vlhkosti a nižších teplotách. Optimální je brzy po ránu, večer, nebo při zatažené obloze. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím BOROSANU Forte.

## Doprava a skladování:

BOROSAN Forte se dopravuje v PE přepravnících nebo jiných obalových jednotkách dohodnutých s odběratelem. BOROSAN Forte se skladuje v polyetylenových nebo sklolaminátových zásobnících nebo obalech, ve kterých je odebírán od dodavatele. Při skladování nesmí dojít k poklesu teploty skladovaného výrobku pod teplotu 0°C. Uchovávejte mimo dosah dětí (S 2). BOROSAN Forte a zbytky jeho aplikačních roztoků nesmí znečistit vodní zdroje včetně recipientů povrchových vod.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Zamezte styku s kůží a očima (S 24/25). Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S 26). Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S 36/37). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S 20/21).

Hmotnost balení: 5, 20, 1000 litrů, cisterny

Doba použitelnosti: 2 roky při skladování v původním obalu