

# CALSOL

Roztok chloridu vápenatého pro listovou aplikaci.

## HNOJIVO ES

### Složení :

16 % vápník (CaO) vodorozpustný ( 223 g / l )

Obsah : 20 l – 26,6 kg NETTO

Výrobce: ROSIER S.A.

Rue du Berceau, 1 – B- 7911 MOUSTIER ( Ht ) – Belgique

tel: +32 69 87 15 69, fax: + 32 69 87 15 69

e-mail: info@rosier-be.com

Dovozce: AGRO ALIANCE, s.r.o. 252 26 Třebotov 304

tel: +420 257830137-8, fax: + 420 257 830 139

### Použití:

CALSOL se používá k zajištění dostatečné výživy vápníkem při pěstování ovoce, vinné révy a plodové zeleniny. Nedostatek vápníku může způsobit fyziologické poruchy plodů ( hořká pihovitost jablek, praskání třešní, nekrózy rajčat paprik i zvýšenou náchylnost ke skládkovým hnilobám.

Réva vinná je při nedostatku vápníku náchylná k ochrnutí stopek bobulí a třapin hroznů.

<b>Plodina</b>	<b>Dávka</b>	<b>Termín aplikace</b>
<b>Jabloně</b>	<b>5 l</b>	<b>6-8 ošetření od začátku července, do sklizně, důležité jsou především poslední aplikace cca 14 dní před sklizní</b>
<b>Třešně, višně</b>	<b>5 l</b>	<b>3-4 postřiky po odkvětu v 10- 14 denních intervalech</b>
<b>Rajčata, papriky</b>	<b>5 l</b>	<b>1. postřik cca 10 dní po nasazení plodů, další po 8 – 10 dnech</b>
<b>Vinná réva</b>	<b>5 l</b>	<b>2-3 aplikace, po odkvětu v 8 – 10 denních intervalech</b>

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci :

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21)

Zamezte styku s kůží a očima (S24/25)

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26)

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S27)

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S36/37)

**Podmínky skladování :**

Skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých skladech při teplotě 5 až 30 °C.  
Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S2/13)