

HNOJIVO ES Kapaln e dusikat e hnojivo N (Ca), 15 (7,5)

15,0 % (v/v) N celkov�y	vodorozpustn�y celkov�y dus�k	196 g/l
10,8 % (v/v) N mo�ovninov�y	vodorozpustn�y amidick�y dus�k	142 g/l
4,2 % (v/v) N �pavkov�y	vodorozpustn�y nitr�tov�y dus�k	54 g/l
7,5 % (v/v) CaO	vodorozpustn�y oxid v�penat�y	104 g/l

V yrobce: AGRA GROUP a.s.,
Tov rn  9, 387 15 St rleck e Ho tice, Czech Republic

Obsah balen : 26 kg • 650 kg • 1300 kg (tj. 20 litr  • 500 litr  • 1000 litr )

Podm nky skladov n : Skladujte odd len e od potravin, mimo dosah d t  a v p vodn ch obalech. Doba pou itelnosti: **36 m s c ** od dod vky hnojiva p i dodr zen i podm nek skladov n . Hnojivo skladujte v p vodn m balen , v zastřešen e m stnosti, p i teplot  v hranici **-25 ÷ +30 C**. Maxim ln  mno stv  vrstev p i skladov n : kanystry 20 dm³ - 3 vrstvy • kontejner 1 m³ - 2 vrstvy.

Listov e hnojivo **CAMPOFORT® Garant Ca** se zvy šen m stimula n m u inkem je ur eno ke kryt  schodku v pn ku v rostlin ch. Jeho  loha spo iv  ve stabilizaci bun e n ch st n a membr n a rovn   m  vliv na aktivitu kyseliny beta-indolyloctov e. Pou iv  se formou mimoko enov  v  yivy postřikem na list rostlin.

Rozsah a zp sob pou it : Hektarov  d vka: **13 kg / ha** (tj. 10 litr  / ha)

P i aplikaci db me t chto z sad:

1. Nepřekračujeme doporu enou koncentraci  ivn ho roztoku.
2. Nestřik me p i prudk m slunci a vysok ch teplot ch; nejlep i je rann  (po sejit  rosy) nebo pozdn  odpoledn  aplikace, postřik p ed de t m nebo za de t  nen  u inn y.
3. Nestřik me porosty fyziologicky  i mechanicky po kozen e nebo siln  napaden e chorobami a  k dci.
4. Nestřik me porosty p ehnojen e dus kem.
5. Na p d ch s n zkou  rodnost  se  einek mimoko enov  v  yivy rostlin nem  e dostate n e projevit.

Doporu en  aplikace listov ch hnojiv CAMPOFORT® dle AVS (aktu ln  v  yivn y stav rostlin):

Plodina	V�voj. f�ze BBCh (BBA, Eichhorn)	kombinace s	hekt. d�vka hnojiva / optim. mno�stv� vody
obiloviny	25 - 61	herbic., fungic., insektic.	13 kg (10 lt.) CF / 120 lt. - 300 lt.
�epka, s�ja, hoř�ce	33 - 61	herbic., fungic., insektic.	13 kg (10 lt.) CF / 120 lt. - 300 lt.
brambory, cukrovka, luskoviny	39 - 75	herbic., fungic., insektic.	13 kg (10 lt.) CF / 150 lt. - 300 lt.
vinn� r�va	26 - 38	herbicidy, insekticidy	13 kg (10 lt.) CF / 500 lt. - 1000 lt.
chmel, ovocn�e plodiny, zelenina	45 - 81	herbic., fungic., insektic.	13 kg (10 lt.) CF / 400 lt. - 2000 lt.
m�k set�y	16 - 61	herbic., fungic., insektic.	13 kg (10 lt.) CF / 200 lt. - 300 lt.
slune�nice	31 - 39	herbic., fungic., insektic.	13 kg (10 lt.) CF / 200 lt. - 300 lt.
kukuř�ce	18 - 32	herbic., fungic., insektic.	13 kg (10 lt.) CF / 120 lt. - 300 lt.

Obsah rizikov ch prvk  v hnojivu nepřekr čuje limitn  hodnoty stanoven e vyhl skou  . 474/2000 Sb.
(Cd < 1 mg/kg • Pb < 15 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pro bezpe nost a ochranu zdrav  p i pr ci:

P i pr ci s hnojivem je zak z no p t, j st, kouřit. Je t eba dodr ovat z sady osobn  hygieny, po pr ci a p ed j dlem om t poko ku rukou teplou vodou a m dlem a o etřit vhodn m repara n m kr mem.

Prvn  pomoc: P i zasa en  o i: okam it  d kladn e vypl chn te vodou a vyhledejte l kařskou pomoc.

Po it : vyp t bezprostředn e po po it  0,5 l vla n e vody a vyhledat l kaře.

Zasa en  poko ky: rychle opl chnout dostate n m mno stv m vody, pozd ji d kladn e, ale bez velk ho mechanick ho dr  d n , om t vodou a m dlem, odlo it zasa en  od v. Ve v ech t   ich p padech, p i po it  nebo zasa en  o i v dy vyhledat l kařskou pomoc.