

## PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN

### Folpan 80 WG

Postřikový kontaktní fungicidní přípravek ve formě mikrogranulátu rozpustného ve vodě k ochraně brambor proti plísni bramborové a révy vinné proti plísni révové.

Účinná látka: **folpet** 80 %, tj.: N-(trichlormethylthio)-ftalimid



Xn–zdraví škodlivý

POZOR!

MŮŽE OHROZIT ZDRAVÍ PŘI POŽITÍ, NADÝCHÁNÍ A STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICEMI!

DRÁŽDÍ POKOŽKU A SLIZNICE!

DRÁŽDÍ OČI!

SENZIBILIZACE PŘI STYKU S KŮŽÍ MOŽNÁ!

PRO VČELY RELATIVNĚ NEŠKODNÝ!

PRO RYBY A OSTATNÍ VODNÍ ORGANISMY JEDOAVATÝ!

PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK, NEŽ JAK JE UVEDENO V NÁVODU NA POUŽITÍ!

CHRAŇTE PŘED DĚTMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

MOŽNÉ NEBEZPEČÍ NEZVRATNÝCH ÚČINKŮ!

POUŽÍVEJTE VHODNÝ OCHRANNÝ ODĚV A OCHRANNÉ RUKAVICE!

**Registrační číslo Mze ČR:** 3980–0

**Výrobce:** MAKHTESHIM Chemical Works, Beer-Sheva, Izrael

**Držitel rozhodnutí o registraci:** MAKHTESHIM – AGAN, Beer-Sheva, Izrael

**Odpovědný zástupce:** AGROVITA s.r.o., Kuřimská 14, 621 00 Brno

**Balení:** Al sáčky; Al sáčky v papírovém kartonu

**Objem:** 100, 200, 600 g; 5 kg

**Číslo šarže:** uvedeno na obalu

**Datum výroby:** uvedeno na obalu

**Doba použitelnosti:** Při správném skladování v původních neporušených obalech je doba použitelnosti přípravku dva roky od data výroby.

#### Působení:

FOLPAN 80 WG je kontaktní fungicidní přípravek s protektivní účinností proti plísni bramborové a nepravému padlí s významnou vedlejší účinností proti padlí, botrytidě, červené skvrnitosti révy vinné, červené spále a bílé hnilobě na révě. Potlačuje růst mycelia a sporulaci houbových patogenů.

#### Návod na použití:

Plodina	Škodlivý činitel	Dávka kg/ha	OL	Poznámky
brambory	plíseň bramborová	2,0	7	–
réva vinná	plíseň révová	1,25–2,0 (0,125–0,2 %)	14	stolní odrůdy
			35	odrůdy určené pro víno v technologii se zákvasem
			45	odrůdy určené pro víno v technologii bez zákvasu

OL = ochranná lhůta (dny) – vymezuje poslední možnost použití před sklizní

#### Příprava postřikové kapaliny:

Odměřené množství přípravku rozmíchejte v menší pomocné nádobě na řídkou kaši, kterou vlijete do nádrže postřikovače naplněného do poloviny vodou, rozmíchejte a doplňte vodou na předepsaný objem. Připravte si takové množství postřikové kapaliny, které spotřebujete. Při přípravě směsi je zakázáno mísit koncentráty. Oba přípravky se vpravují do nádrže odděleně.

### **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:**

Při práci s přípravkem je nutno používat ochranný pracovní oděv proti chemikáliím s kapucí, který umožňuje současně nosit prostředek na ochranu dýchacích orgánů, obličejový štít Š-P 15 + polomaska Protetika typ RU-20 s filtrem P1 nebo P2, případně komerčně dostupné schválené ekvivalenty, ochranné rukavice z plastu nebo pryže, pryžové holínky. Při ředění postřiku se navíc používá zástěra z PVC nebo pogumovaného textilu.

Při práci a po jejím ukončení až do vyslečení pracovního oděvu a důkladného umytí mýdlem a teplou vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po umytí ošetřte pokožku rukou reparačním krémem. Postřik provádějte pouze za bezvětří či mírném vánku vždy ve směru větru od pracujících. Postřik nesmí být zanesen do sousedních kultur. Při styku s ohněm se eventuální požár hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, eventuálně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména, aby nepronikla do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nezasáhla zemědělskou půdu.

**Důležité upozornění:** při požárním zásahu musejí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin!

### **První pomoc:**

**Při požití:** při náhodném požití podat 10 tablet aktivního uhlí + 0,5 l vlažné vody a drážděním hrdla vyvolat zvracení!

**Při zasažení oka:** vyplachovat velkým množstvím vody po dobu 15 min. a opět vyhledat lékaře, zejména pokud přetrvává podráždění.

**Při zasažení pokožky:** odstranit potřísněný oděv a zasažená místa omýt mýdlem a teplou vodou.

**Při nadýchání:** vynést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.

V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři!

Informovat o podané první pomoci a přípravku, s nímž postižený pracoval. Terapii lze konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Toxikologické informační středisko – Klinika nemocí z povolání, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 02/24919293.

### **Skladování:**

Přípravek skladujeme v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5–30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před mrazem a přímým slunečním světlem.

### **Likvidace obalů a zbytků:**

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se vylijí do mělké rýhy na ošetřeném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje pozemních vod ani recipienty povrchových vod. Případné obaly od přípravků se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo se spálí ve schválené spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou ve 2. stupni 1200–1400 °C a čištěním plynových zplodin. Stejným způsobem je po nasáknutí do vhodného materiálu (piliny) nutno likvidovat nepoužitelné zbytky přípravku. Oplachovou vodu po čištění obalů použijeme na přípravu postřikové kapaliny. Aplikační zařízení se opláchně 3 % roztokem sody a omyje vodou.

FOLPAN 80 WG je registrovaná ochranná známka firmy MAKHTESHIM-AGAN Ltd., Izrael

---