

Kapalné NK (S) hnojivo 25,5-6,5 (10,2)

25,5 % (v/v) N	celkový vodorozpustný dusík	318 g/l
6,9 % (v/v) K ₂ O	celkový vodorozpustný draslík	86 g/l
10,2 % (v/v) S	polysulfidická síra	120 g/l
pH: 9,5 - 11		

Výrobce: AGRA GROUP a.s.,
Tovární 9, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic

Obsah balení: 1,2 kg • 12 kg • 24 kg • 60 kg • 240 kg • 1200 kg
(tj. 1 litr • 10 litrů • 20 litrů • 50 litrů • 200 litrů • 1000 litrů)

Podmínky skladování: Skladujte odděleně od potravin, mimo dosah dětí a v původních obalech. Doba použitelnosti: **36 měsíců** od dodávky hnojiva při dodržení podmínek skladování. Hnojivo skladujte v původním balení, v zastřešené místnosti, při teplotě v hranici **-25 ÷ +30°C**. Maximální množství vrstev při skladování: kanystry 20 dm³ - 3 vrstvy • kontejner 1 m³ - 2 vrstvy.

POLYSULFAMIN je kapalný přípravek pro výživu rostlin s vedlejším fungicidním a akaricidním účinkem, koncentrát biologicky aktivních přírodních oligopeptidů a aminokyselin se sírou a draslíkem.

Rozsah a způsob použití: Hektarová dávka: **1,2-6 kg / ha** (tj. 1-5 litrů / ha)

Při aplikaci dbáme těchto zásad:

1. Nepřekračujeme doporučenou koncentraci živného roztoku.
2. Nestříkáme při prudkém slunci a vysokých teplotách; nejlepší je ranní (po sejítí rosy) nebo pozdně odpolední aplikace, postřík před deštěm nebo za deště není účinný.
3. Nestříkáme porosty fyziologicky či mechanicky poškozené nebo silně napadené chorobami a škůdci.
4. Nestříkáme porosty přehnojené dusíkem.
5. Na půdách s nízkou úrodností se účinek mimokořenové výživy rostlin nemůže dostatečně projevit.

Doporučené aplikace hnojiva POLYSULFAMIN:

Plodina	Vývoj. fáze BBCh (BBA, Eichhorn)	kombinace s	hekt. dávka hnojiva / optim. množství vody
obiloviny	25 - 61	herbic., fungic., insektic.	1,2-6 kg (1-5 lt.) / 300 lt.
řepka, sója, hořčice	33 - 61	herbic., fungic., insektic.	1,2-6 kg (1-5 lt.) / 300 lt.
brambory, cukrovka, luskoviny	39 - 75	herbic., fungic., insektic.	1,2-6 kg (1-5 lt.) / 300 lt.
vinná réva	26 - 38	herbicidy, insekticidy	1,2-6 kg (1-5 lt.) / 500 lt. až 1000 lt.
chmel, ovocné plodiny, zelenina	45 - 81	herbic., fungic., insektic.	1,2-6 kg (1-5 lt.) / 400 lt. až 2000 lt.
mák setý	16 - 61	herbic., fungic., insektic.	1,2-6 kg (1-5 lt.) / 200 lt. až 300 lt.
slunečnice	31 - 39	herbic., fungic., insektic.	1,2-6 kg (1-5 lt.) / 200 lt. až 300 lt.
kukuřice	18 - 32	herbic., fungic., insektic.	1,2-6 kg (1-5 lt.) / 300 lt.

Obsah rizikových prvků v hnojivu nepřekračuje limitní hodnoty stanovené vyhláškou č. 474/2000 Sb.
(Cd < 1 mg/kg • Pb < 15 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při práci s hnojivem je zakázáno pít, jíst, kouřit. Je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, po práci a před jídlem omýt pokožku rukou teplou vodou a mýdlem a ošetřit vhodným reparačním krémem.

První pomoc: Při zasažení očí: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požítí: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění, omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv. Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.