

RAMROD® FLO

Postřikový přípravek ve formě tekutého dispergovatelného koncentrátu pro ředění vodou k hubení plevelů v kukuřici, cibuli, řepce a karafiátech a maceškách.

Účinná látka :
propachlor 480 g/l

JED ! MŮŽE OHROZIT ZDRAVÍ PŘI POŽITÍ, NADÝCHÁNÍ A STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICEMI! DRÁŽDÍ OČI POKOŽKU A SLIZNICE! MOŽNÝ SENSIBILIZÁTOR PŘI STYKU S POKOŽKOU PRO VČELY ŠKODLIVÝ ! PRO RYBY A OSTATNÍ VODNÍ ORGANISMY JEDOVATÝ ! PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK NEŽ JAK JE UVEDENO V NÁVODU K POUŽITÍ!
CHRAŇTE PŘED DĚTMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

Registrační číslo: 4016

Výrobce: Monsanto Europe S.A. Avenue Tervuren, Brusel, Belgie

Působení :

Ramrod Flo je kořenový a listový herbicid. Dvouděložné plevele hubí v době od klíčení až do vývinu dvou pravých listů. Jednoděložné plevele hubí v době od klíčení do prvního listu. Herbicidní účinek přípravku je závislý na vlhkosti půdy. Už 7 mm dešťových srážek po aplikaci příznivě ovlivňuje účinnost přípravku. Doba herbicidní účinnosti je dle podmínek 6-8 týdnů.

Spolehlivě hubí následující plevele:

jednoděložné : ježatka kuří noha, béry, lipnice roční

dvouděložné : starček obecný, hluchavky, laskavec ohnutý, peřour maloúborný, kopřiva

žahavka, kokoška pastuší tobolka, konopice, drchnička rolní

Méně citlivé druhy jsou: hořčice rolní, merlík bílý, ohnice

Návod k použití :

Plodina	Dávka l.ha ⁻¹	Poznámky
kukuřice	7-10 l	po setí před vzejitím možno kombinovat s ošetřením registrovanými přípravky na bázi atrazinu
řepka ozimá	8-10 l	
cibule setá	6-8 l	
karafiáty, macešky	9 l	

Poznámky :

1) Kukuřice

Ošetření se provádí po setí, před vzejitím kukuřice, především na pozemcích se silným výskytem ježatky kuří nohy a bérů.

2) Řepka ozimá

Ošetření se provádí po setí, před vzejitím řepky.

3) Karafiáty a macešky

Ramrod Flo se používá 2 týdny po výsadbě, nejpozději při vzcházení plevelů.

4) Cibule setá

Ošetření se provádí po zasetí nebo sázení cibule před vzejitím plevelů i na list cibule, nejpozději ve stadiu děložních listů plevelů. Proti novému zaplevelení v letním období je možné RAMROD FLO použít na list cibule. Při výskytu ovsa hluchého je možné doplnit zásah ošetřením registrovanými přípravky na bázi účinné látky ethofumesate.

5) Dávkování postřikové kapaliny : 400-600 l.ha⁻¹

®zapsaná ochranná známka MONSANTO EUROPE S.A.