

REXAN®

Výrobce: BIOSFOR s.r.o.,
Slepotice 36, 530 02 Pardubice

Číslo rozhodnutí o registraci **0505**.

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vodný roztok s účinnými látkami: kyselina 2-aminobenzoová 1,0 g/l,
4-hydroxyacetanilid 3,0 g/l

Obsah rizikových prvků:

Splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg pomocné látky: Cd ≤ 1,0 ; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0;
As ≤ 10,0; Cr ≤ 50,0. Včely – PR, ryby –PR.

Druh úpravy přípravku:

Postřikový přípravek ve formě kapalného koncentrátu ředitelného vodou.

Rozsah a způsob použití: Pomocný prostředek zvyšující kvalitu a výnosy semene řepky, obilnin i ostatních plodin. Je ředitelný vodou.

Dávkování: REXAN se aplikuje v dávce **0,1 l/ha** zředěný při pozemní aplikaci **200 až 400 l**, při letecké aplikaci **40 až 100 l** vody. Postřik lze kombinovat s hnojivý, fungicidy a insekticidy.

Registrované aplikace:

| Plodina | Termín aplikace |
|----------------|---|
| Řepka olejná | T1: v období butonizace, fáze žlutého poupěte (DC 50-59) T2: v době květu (DC 61-65) |
| Obilniny ozimé | T1: 7 až 10 dnů před metáním (DC 37-45) T2: po odkvětu (DC 69-71) |
| Ječmen jarní | T1: v průběhu odnožování (DC 22 – 29) T2: 7 až 10 dnů před metáním (DC 37 – 45) T3: po odkvětu (DC 69-71) |

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Likvidace zbytků:

Zbytky postřikové kapaliny ani vyplachovací vody nesmí zasáhnout zdroje i recipienty povrchových vod. Zbytky v obalu se likvidují výplachem vodou, která se použije v následné přípravě postřikové jichy. Zbytky postřikové kapaliny se vlijí do rýhy vyhloubené na ošetřovaném pozemku a nechají se vsáknout. Obaly a použité nářadí, nástroje a ochranné pomůcky se asanují prostředky na výplach postřikovačů (např. Sagrol) a omyjí se vodou. Prázdné obaly po asanaci se recyklují.

Podmínky skladování:

Rexan se skladuje v původních dobře uzavřených obalech, v suchých skladech, odděleně od potravin a krmiv, při teplotě +5 až + 30°C . Chraňte před nepoučenými osobami a dětmi, před přímým slunečním svitem a sálavým teplem.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 36/37/39- Používejte ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo štít.

První pomoc:

Při požití – vypít 0,5 l vlažné vody s 10 tabletami medicijního uhlí.

Při zasažení očí – vyplachujte proudem vlažné vody po dobu 15 minut.

Při potřísnění pokožky – odstraňte znečištěný oděv, pokožku omyjte vodou a mýdlem.

Ve všech případech poškození zdraví je třeba postiženému zajistit lékařské ošetření.

Doba použitelnosti : 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.

Velikost balení: 0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 3; 5; 10; 15; 20; 25; 50; 120; 220; 640; 1000 litrů.

PN: 01-100-98.

Datum výroby: