

RUBIGAN 12 EC

Postřikový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu proti strupovitosti na jádrovinnách, padlí na jabloních, broskvonních, okurkách, tabáku a okrasných rostlinách, proti skvrnitosti listů višní a třešní a dalším houbovým chorobám rostlin.

Účinná látka :
fenarimol 120 g/l

Registrační číslo: 3391-0

Držitel rozhodnutí o registraci: DowElanco Ltd., GB

Zástupce v ČR: DowElanco, Miroslav

Výrobce : DowElanco Ltd., GB

Návod k použití:

| Plodina | Škodlivý organismus | Dávkování / ha Koncentrace (%) | OL/dny | Poznámky |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jádroviny | strupovitost | 0,6 l 0,06 %* | 28 | podle signalizace, nejpozději do 72 hodin po infekci |
| jabloň | padlí jabloňové | 0,45-0,6 l 0,045-0,06 %* | 28 | od fáze zeleného poupěte do konce července v 7-14 denních intervalech dle infekčního tlaku a rychlosti růstu |
| okurka | padlí | 0,2 l | 4 | začátek při prvních příznacích a dále pak dle potřeby v 8 - 10 denních intervalech |
| réva vinná | padlí révové | 0,2 l 0,02 %* | 28 | preventivně od fáze 5. - 6. listu, opakovat dle potřeby v intervalu 7 - 10 dní do počátku zaměkání |
| broskvoň | padlí broskvoňové | 0,6 l 0,06 %* | 28 | preventivně či při prvních příznacích choroby, opakovat podle potřeby v intervalu 7 - 14 dní |
| růže | padlí růžové | 0,05 % (0,15-0,5 l) | 2 | u polních růží v intervalu 10-14 dní, u skleníkových růží v intervalu 7-14 dní |
| třešeň, višeň | skvrnitost listů třešně | 0,5 l 0,05 %* | 28 | prvé ošetření koncem května, druhé za 10-15 dní a dále dle potřeby ve 2 - 3 týdenních intervalech |
| fenykl | hnědá skvrnitost fenyklu | 0,03% | | při rozkvětu vedlejších okolíků |
| tabák | padlí tabákové | 0,2 l | 28 | podle potřeby ve 2-3 týden.intervalech |
| rybíz, angrešt | americké padlí angreštové | 0,03 %* | | ošetření jen před květem a po sklizni |

* vztaženo na 1000 l aplikační kapaliny na 1 ha

Doporučené množství aplikační kapaliny: 300 - 600 l/ha pro polní plodiny,

300 - 1000 l/ha pro ovocné dřeviny a révu
vinnou.