



SR®-11

Postřikový repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří v době vegetačního klidu.

VZHLED A SLOŽENÍ: SR-11 je stříkatelná pastovitá směs s vodou mísitelná, po zaschnutí již vodou nerozpustná, šedomodré barvy. Obsahuje směs repelentních a čichových látek (přírodního a syntetického původu) s přísadou, vytvářející na sazenicích porézní ochrannou vrstvu.

POZOR!

**SR-11 DRÁŽDÍ OČI, DÝCHAČÍ ORGÁNY A KŮŽI (R36/37/38)
SENZIBILIZACE PŘI STYKU S KŮŽÍ MOŽNÁ (R43). ŠKODLIVÝ PRO VODNÍ ORGANISMY (R 52). UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A NEPOUČENÝCH OSOBI (S 2). NEJEZTE, NEPIJTE A NEKURTE PŘI PRÁCI (S 20/21). ZAMEZTE STYKU S OČIMA (S 52). POUŽÍVEJTE VHDNÝ OCHRANNÝ ODĚV, OCHRANNÉ RUKAVICE A OCHRANNÉ BRÝLE NEBO OBLIČEJOVÝ ŠTÍT (S 36/37/39). PŘI POŽITÍ OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC A UKAŽTE TENTO OBAL NEBO ETIKETU (S 46). PRO VČELY RELATIVNĚ NEŠKODNÝ PŘI DODRŽENÍ PŘEDEPSANÉ DÁVKY NEBO KONCENTRACE POSTŘIKOVÉ KAPALINY (Vč 3). PRO ZVĚŘ RELATIVNĚ NEŠKODNÝ (Z 3). PRO RYBY NEBEZPEČNÝ (Vo 1). PŘÍPRAVEK JE VYLOUČEN Z POUŽITÍ VE VNITŘNÍ ČÁSTI 2. PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY ZDROJŮ PODZEMNÍCH I POVRCHOVÝCH VOD. POKUD NENÍ TOTO PÁSMO ROZDĚLENO NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ČÁST, JE VYLOUČENO Z POUŽITÍ V CELÉM 2. PÁSMU HYGIENICKÉ OCHRANY. PŘÍPRAVEK JE ZAKÁZÁNO POUŽÍT JAKO CELOPLOŠNÝ POSTŘÍK V BLÍZKOSTI VODOTEČÍ. PŘED POUŽITÍM PŘÍPRAVKU SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.**

ROZSAH POUŽITÍ: SR-11 je určen výhradně k ochraně lesních kultur proti zimnímu okusu zvěří. Jehličnany se ošetřují po úplném zdřevnatění výhonů, listnáče po zežloutnutí nebo opadu listů. Ošetření se provádí postřikem, v případě nutnosti lze použít i nátěr. Na spotřebu přípravku má vliv velikost ošetřovaných částí sazenic. Přípravek je možno použít na vlhké sazenice a pracovat s ním do +5°C.

Aplikace nelze provádět při teplotách nižších než +5°C a na namrzlém povrchu dřevin. Po ošetření musí přípravek alespoň částečně zaschnout, aby nebyl splaven deštěm. Správně aplikovaný přípravek zajišťuje ochranu proti okusu zvěří po dobu 6 až 7 měsíců.

NÁVOD K POUŽITÍ: SR-11 je určen pro přímou aplikaci postřikem. Před aplikací nutno přípravek řádně promíchat. V případě zhoustnutí jej lze za stálého míchání naředít vodou v maximálním poměru 3 díly přípravku na 1 díl vody (vodu vždy naléváme za stálého míchání do přípravku, nikdy naopak). Větším ředěním se snižuje repelentní účinnost a mohlo by dojít k porušení suspenze. Naředí se však pouze takové množství přípravku, které lze okamžitě spotřebovat. Připravovat zásobní naředěný přípravek pro aplikaci v následujících směnách se nedoporučuje. Po zaschnutí je přípravek vodou nerozpustný.

K postřiku jsou vhodné tlakové postřikovací přístroje s membránovým čerpadlem a tryskou o průměru 1,0 - 1,2 mm. Při plnění přístroje je třeba přípravek procedit sítím o velikosti ok do 1 mm. K nátěru se přípravek neředí. Sazenice jehličnanů a listnáčů se natírají měkkými kartáči na dlouhých rukojetích, širokým plochým štětcem za použití prkének k přidržování sazenic, nebo rukavic z PVC přes níz je natažena rukavice látková. Na ošetřených sazenicích se utvoří souvislá vrstva šedomodré barvy, která po zaschnutí poskytuje dlouhodobou ochranu před zimním okusem zvěří.

Pomůcky a přístroje použité při práci s SR-11 je třeba ihned po použití vymýt dokonale 3% roztokem sody ve vodě. Funkční části postřikovačů je nutné občas rozebrat a dokonale vyčistit od možné usazeniny proplachem vodou ještě před zaschnutím. Používejte ochranné rukavice.

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ: Průměrná spotřeba SR-11 **při aplikaci postřikem** na 1 000 sazenic do 2 let věku je 8-10 kg, starší výsadba 10-12 kg, ředí se v poměru 3:1 (přípravek/voda). Průměrná spotřeba SR-11 **při aplikaci nátěrem** na 1 000 sazenic je 6-9 kg, vodou se neředí.

UPOZORNĚNÍ: Před aplikací nesmí být přípravek vystaven vyšší teplotě než je maximální teplota skladovací (zákaz přímého ohřevu zdroji tepla o vyšší teplotě). Výrobce bere záruku za kvalitu výrobku ve smyslu platné PN. Protože však okus zvěří je ovlivňován řadou

vnějších vlivů (dostupnost potravy, sněhová pokrývka, zazvěření, zdravotní stav zvěře a pod.), neručí výrobce za eventuální poškození ošetřených kultur zvěří. Výrobce neručí za škody, způsobené nesprávným použitím přípravku. Případné změny v rozsahu použití jsou uvedeny v platném Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

Při nátěru přípravku používejte ochranný pracovní oděv + kobouk a zástěru, ochranný obličejový štít ŠP-15 nebo D1 s čepcem, gumové nebo PVC rukavice a gumové boty, popřípadě komerčně dostupné a schválené ekvivalenty uvedené typové ochrany. Při postřiku je třeba navíc použít respirátor RU-20 s vložkovým filtrem A1, při ředění přípravku zástěru z PVC nebo z pogumovaného textilu.

Při práci a po ní až do vysvělení ochranného oděvu a důkladného omytí teplou vodou a mýdlem, je zakázáno jíst, pít a kouřit. Znečištěné pracovní oděvy lze vyčistit 3% roztokem sody ve vodě. Používejte ochranné rukavice.

Přípravek není hořlavou kapalinou. Obsahuje jako rozpouštědlo vodu s přídavkem xylenu. S vodou se mísí pouze do zaschnutí suspenze. Pokud se dostane do ohniska požáru je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební voda, pokud byla při hašení použita, nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů podzemních vod a recipientů povrchových vod a nesmí zasáhnout zemědělskou půdu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření mohou vznikat toxické zplodiny.

LIKVIDACE OBALŮ A ZBYTKŮ PŘÍPRAVKU:

Prázdné obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat do sběru k recyklaci nebo se spálí ve spalovně vybavené dvoustupňovým spalováním s teplotou 1200 - 1400°C ve druhém stupni a s čištěním plynných zplodin. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny.

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jichy se vylijí do mělké rýhy na ošetřeném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod, ani recipienty povrchových vod. Případné zbytky přípravku se po nasáknutí do hořlavého materiálu (piliny) spálí ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly. Obaly se zaschlými zbytky přípravku lze vyčistit mechanicky jemnou deformací PP kbelíku, kdy většina přilepeného zbytku přípravku z deformovaných stěn opadá. S takto vzniklým materiálem se zachází stejně jako s ostatními zbytky přípravku.

PRVNÍ POMOC:

Obecné zásady první pomoci:

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybnosti vyhledejte lékařskou pomoc.

Při stavech ohrožujících život je třeba přednostně provádět resuscitaci:

postižený nedýchá

-je nutné okamžitě provádět umělé dýchání

zástava srdce

-je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce

bezvědomí

-je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy

a) při zasažení pokožky - odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množstvím vody, pokud nedošlo k poškození pokožky (poranění) je možné použít i mýdlo, zajistěte lékařské ošetření

b) při zasažení očí - ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím), výplach provádějte nejméně 10 minut, zajistěte lékařské ošetření

c) při požití - pokuste se o vyvolání zvracení, dejte vypít 0,5 l vlažné vody a znovu vyvolejte zvracení, pokud možno podejte medicínální uhlí, zajistěte lékařské ošetření

d) při nadýchání - okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv), zajistěte postiženého proti prochlazení, zajistěte lékařské ošetření

Další léčbu lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem v Praze na adrese: Toxikologické informační středisko, Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel.: 02 - 24 91 92 93.

BALENÍ:

SR-11 se plní do polypropylenových obalů á 10 kg. Obaly jsou recyklovatelné.

SKLADOVÁNÍ:

SR-11 se skladuje v originálních obalech v čistých uzamykatelných skladech, odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků, hořlavin a prázdných obalů od těchto látek při teplotě od +5°C do +30°C. (Chraňte před mrazem a slunečním svitem). Stejně podmínky dodržujte při přepravě a použití. Spotřebujte pokud možno ještě v roce výroby. Pro skladování platí ČSN 46 5891.

DOBA POUŽITELNOSTI VÝROBKU:

Při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních obalech 2 roky od data výroby.

VÝROBCE A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI:

NeraAgro, spol. s r.o., Neratovice, ČR, IČO: 261 33 733

® - ochranná známka
NeraAgro, spol. s r.o.

INFORMACE O VÝROBKU PODAJÍ:

Obchodní oddělení NeraAgro, spol. s r.o.
tel.: 0206 / 66 44 60, 66 27 38
fax: 0206 / 66 46 36, 66 54 30