



SANATEX VS

+ VAZTAK 10 SC (tank mix)



INSEKTICIDNÍ PŘÍPRAVEK K CELOROČNÍ OCHRANĚ LESNÍCH KULTUR PROTI KLIKOROHU BOROVÉMU, LÝKOŽROUTU SMRKOVÉMU A OSTATNÍM KŮROVCŮM

VZHLED A SLOŽENÍ:

SANATEX VS + VAZTAK 10 SC je tekutá směs bílé barvy, charakteristického zápachu, mísitelná s vodou, nehořlavá.

ÚČINNÁ LÁTKA/OBSAH: ALPHA-CYPERMETHRIN, 10 g / litr
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 1532-0
DRŽITEL REGISTRACE: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, Spytihněv

Označení specifické rizikovosti:

R 52/53 Skodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání:

- S 1 Uchovávejte uzamčené
- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S 22 Nevdechujte prach
- S 23 Nevdechujte aerosoly
- S 24 Zamezte styku s kůží
- S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
- S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
- S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
- S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad
- S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

Standardní věty vyjadřující bezpečnostní pokyny pro ochranu lidí, zvířat nebo životního prostředí:

- SP1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem

Nesmí být použito jinak, než je uvedeno v návodu. Může ohrozit zdraví při požití, nadýchání a styku s pokožkou a sliznicemi. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ:

Přípravek je pro včely relativně neškodný, při dodržení předepsané dávky nebo koncentrace postřikové kapaliny. Přípravek je považován za nebezpečný pro ryby.

ROZSAH POUŽITÍ:

Celoroční prevence a ošetření proti klikorohu borovému, lýkožROUTU smrkovému, ostatním kůrovcům a dalším běžným škůdcům se provádí natíráním, nástřikem nebo namáčením. Přípravek se aplikuje štětcem nebo vhodným postřikovačem. Přípravek při správné aplikaci působí po celou dobu vegetačního období (duben - září).

SPOTŘEBA:

0,9 – 1,2 litru neředěného přípravku na 1000 sazenic

BALENÍ:

SANATEX VS + VAZTAK 10 SC se dodává v PE dózách o objemu 1 litr

NÁVOD NA POUŽITÍ:

- ◆ Přípravek se používá ředěný v poměru 1:9 s vodou (1 litr přípravku na 9 litrů vody). Před použitím důkladně promíchat,
- ◆ přípravek se nanáší natíráním, namáčením nebo nástřikem,
- ◆ nátěr se provádí štětcem po důkladném promíchání,
- ◆ při aplikaci namáčením se ponoří vrcholové prýty sazenic do přípravku, poté se umístí na síto a nechají okapat do bezdotekové nádoby – odkapaný přípravek lze po důkladném promíchání znovu použít,
- ◆ k postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a s vířivou tryskou (CP-3, CP-15, SOLO 475),
- ◆ doporučuje se při plnění postřikovače procedit přípravek sítím postřikovače,
- ◆ přípravek může být nanášen i na vlhký podklad při teplotě od +5°C, po nanesení ale musí zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.

LIKVIDACE:

Prázdné plastové obaly od přípravku se po důkladném vypláchnutí mohou předat k recyklaci do sběru nebo spálí ve schválené spalovně, vybavené dvojitým spalováním s teplotou 1200–1400 °C ve druhém stupni a s čištěním plyných zplodin. Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny. Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jichy se vylíjí do malké ryhy na ošetřenému pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

SKLADOVÁNÍ, DOPRAVA:

SANATEX VS + VAZTAK 10 SC se skladuje v čistých, suchých a uzavřených skladech při teplotě od 5°C do 30°C, oddělených od skladů s potravinami a krmivými. Přípravek se přepravuje krytými dopravními prostředky. Při venkovní teplotě pod 0°C musí být přípravek přepravován vozidly vybavenými tepelnou izolací.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při práci s přípravkem SANATEX VS + VAZTAK 10 SC je třeba chránit pokožku, sliznici a oči. K tomu účelu musí být použity osobní ochranné pracovní prostředky: pracovní oděv např. Unita nebo ekvivalent, gumové rukavice, pracovní obuv a při stříkání obličejový štít např. Š-P 15 + polomaska PROTETIKA typ RU-20.s možkovým filtrem A1. Při práci s přípravkem SANATEX VS + VAZTAK 10 SC je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce je třeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem.

PRVNÍ POMOC:

Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím čisté (pitné) vody. Při potřísnění pokožky omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití přípravku vypláchnout postiženému ústa, podat mu 0,5 l vlažné vody a vyvolat zvracení, pokud je postižený při vědomí. Postižený, který požil SANATEX VS + VAZTAK 10 SC nebo má oči zasažené tímto přípravkem, musí být dopraven lékaři.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku. Při správném skladování je záruční doba 24 měsíců od data výroby.

OBJEM NÁPLNĚ: 1 litr

DATUM VÝROBY:

ČÍSLO ŠARŽE:

