

**Terra-Sorb foliar**  
**Speciální listové hnojivo s vysokým obsahem přírodních i volných aminokyselin a stopových prvků.**

Výrobce: **Complejo Industrial Bioibérica, S.A.**

**Ctra. Nacional II, Km 680,6, Palafolls (Barcelona), Španělsko**

Dodává: **Agrovita spol. s r.o., K zeleným domkům 15, 148 00 Praha 4 - Kunratice**

Číslo typu: **netylizované**

číslo rozhodnutí o registraci:

**Chemické a fyzikální vlastnosti:**

Vlastnost	hodnota
Celkový obsah L- $\alpha$ volných aminokyselin v %	<b>9,3</b>
Celkový obsah dusíku jako N v %	<b>2,1</b>
Celkový obsah organického dusíku v %	<b>2,1</b>
Celkový obsah $\alpha$ -aminického dusíku v %	<b>1,5</b>
Celkový obsah boru jako B v %	<b>0,02</b>
Celkový obsah zinku jako Zn v %	<b>0,07</b>
Celkový obsah manganu jako Mn v %	<b>0,04</b>
Hodnota pH	<b>od 4,9 do 5,5</b>

**Obsah rizikových prvků:**

Splňuje zákonem stanovené limity: kadmium 1 mg/kg, olovo 10 mg/kg, rtuť 1,0 mg/kg, arzen 10 mg/kg, chrom 50 mg/kg.

**Rozsah a způsob použití:**

Přítomnost aminokyselin zlepšuje smáčitelnost a průchodnost kutikuly listů, podporuje otevírání průduchů a usnadňuje v rostlině transport živin včetně mikroelementů. Stimuluje fotosyntézu a transpiraci. Biologicky aktivní cheláty vytvořené aminokyselinami jsou účinnými dopravci živin přes buněčné membrány. Hnojivo zvyšuje odolnost vůči stresovým faktorům, například suchu, vysokým i nízkým teplotám, mrazu, krupobití aj. a urychluje regeneraci poškozených rostlin. Používání **Terra-Sorb foliar** zvyšuje výnos i kvalitu produktů – velikost, vyrovnanost, vybarvení a pevnost plodů, odolnost k praskání a při přepravě, skladovatelnost, obsah nutričních látek

**Návod k použití a dávkování:**

Plodina	Termín aplikace	Dávka	Poznámka
Listová zelenina	Za stresových podmínek	3 l/ha	Lze aplikovat spolu s pesticidy
Plodová zelenina	Po odkvětu, v době tvorby a růstu plodů a za stresových podmínek	3 l/ha	Lze aplikovat spolu s pesticidy
Jahody	V období plného květu a nasazování plodů i při působení stresových podmínek	3 l/ha	Lze aplikovat spolu s pesticidy *
Jádroviny, peckoviny	Během kvetení, opadu	3 l/1000 l	Lze aplikovat spolu

	okvětních lístků a vývoje plodů	vody	s pesticidy *
Réva vinná	V době rašení, objevení květenství, kvetení a dozrávání	3 l/ha	Lze aplikovat spolu s pesticidy *
Okrasné rostliny	V období růstu i květu a za stresových podmínek	0,3 l/100 l vody	
Brambory	Ošetřovat se začíná při výšce rostlin 15 cm, opakuje se v 3–4 týdenních intervalech	3 l/ha	Lze aplikovat spolu s pesticidy *
Cukrovka	1. aplikace ve fázi 2–3 pravých listů, 2. aplikace ve fázi 5–6 pravých listů, 3. aplikace při uzavírání řádků	2–3 l/ha	Lze aplikovat spolu s pesticidy
Obilniny	V plném odnožování	2–3 l/ha	Lze aplikovat spolu s pesticidy
Kukuřice, slunečnice	Ve fázi 2–4 listů, ošetření opakovat za 20 dnů	2–3 l/ha	

\* při použití přípravků na bázi síry, mědi nebo oleje se doporučuje snížit dávku hnojiva na polovinu a nejdříve přezkoušet v malém množství stálost postřikové kombinace

#### **Příprava aplikačních roztoků:**

Odměřené množství přípravku se za účinného míchání pomalu vlije do nádrže postřikovače naplněné asi do poloviny až dvou třetin vodou. Po důkladném promíchání obsahu nádrže se doplní potřebné množství vody. Možnost míchání s pesticidy či listovými hnojivy konzultujte s jejich výrobcem.

#### **Zneškodňování obalů a zbytků**

Prázdné obaly odevzdejte k recyklaci do separovaného sběru. Větší obaly po důkladném vyprázdnění spalte ve schválené spalovně. Oplachovou vodu použijte na přípravu postřikové kapaliny. Případné zbytky postřikové směsi vylijte do mělké rýhy na ošetřeném pozemku. Po skončení práce vypláchnout nádrž postřikovače vodou, resp. vodním roztokem přípravku AGROPUR. Přípravek ani jeho zbytky a oplachové vody nesmí zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty povrchových vod.

Asanace: aplikační zařízení, osobní ochranné pracovní prostředky a pomocné nádoby asanujte za použití přípravku AGROPUR.

#### **Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.**

Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice (S36/37). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S27). Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13). Při náhodném požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (S 46). Uchovávejte v originálním obale (S49).

#### **Skladování:**

Składujte v původních, dobře uzavřených a neporušených obalech v krytých, větraných, hygienicky čistých a uzamykatelných skladech odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků, hnojiv, hořlavin i obalů od těchto látek.

**Doba použitelnosti:** 4 roky od data výroby v původních obalech při dodržení podmínek

skladování.

**Datum výroby:**

**Číslo šarže:**

**Hmotnost obalové jednotky:** 1, 5, 20, 220, 1000 litrů