# TOLURON - STEFES

Postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého dispergovatelného koncentrátu určený k hubení chundelky metlice, psárky polní a dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém ječmeni a triticale bez podsevu a v máku.

**Účinná látka:**
**chlortoluron 500 g/l**

MŮŽE OHROZIT ZDRAVÍ PŘI POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICEMI!
PRO VČELYRELATIVNĚ NEŠKODNÝ!
PRO RYBY A OSTATNÍ VODNÍ ORGANISMY JEDOVATÝ!
PŘÍPRAVEK NESMÍ BÝT POUŽIT JINAK, NEŽ JAK JE UVEDENO V NÁVODU!
CHRAŇTE PŘED DĚTMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

Registrační číslo MZe ČR: 3891
Vyrobce: NUFARM, Pflanzenschutz GmbH & Co KG
St.-PeterStrasse 25, A-40021 Linz AUSTRIA
Distributor: Stefes ČR spol. s r.o.
Zakostelí 211 768 02 ZDOUNKY Česká republika

**Působení přípravku:**
Chlortoluron je přijímán kořeny i listy rostlin a v rostlině blokuje fotosyntézu. Srážky po aplikaci, dostatečná půdní vlhkost a dobře připravený pozemek bez velkých hrud jsou faktory, které příznivě ovlivňují herbicidní účinnost. Vysoká hrudovitost a vysoký obsah organické hmoty nebo jílu účinnost naopak snižují. Toluron - Stefes může být použit preemergentně i postemergentně.

**Spektrum účinnosti přípravku:**
Toluron - Stefes hubí spolehlivě většinu jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů klíčících na podzim jako např. :
chundelka metlice, psárka rolní, jílky, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, konopice rolní, kolenec rolní, heřmánky, rmeny, heřmánkovec přímořský, ptačinec žabinec, drchnička rolní, hluchavka nachová, rdesna, pryšce, zemědým lékařský, pomněnka rolní, penízek rolní, laskavec ohnutý, merlík bílý, mléč rolní.

**Návod k použití:**

| plodina | škodlivý činitel | dávka $l.ha^{-1}$ | poznámka |
|---|---|---|---|
| pšenice ozimá<br>ječmen ozimý | chundelka metlice,<br>dvouděložné plevele | 1,5 - 3 l | na podzim nebo na jaře |
| triticale | chundelka metlice,<br>dvouděložné plevele | 1,5-2 l | na podzim nebo na jaře |
| mák | chundelka metlice,<br>dvouděložné plevele | 1,2-2,4 l | preemergentně 1,2-1,3 l/ha<br>postemergentně plnou dávku |

Toluron - Stefes se aplikuje v **ozimé pšenici** preemergentně do 2 dnů po zasetí ozimé pšenice na dobře připravený pozemek s půdou bez hrud nebo postemergentně. Dávkování podle růstové fáze, ošetření na jaře co možná nejdříve, aby bylo dosaženo spolehlivé herbicidní účinnosti. Postemergentní ošetření se provádí od úplného vývinu 4. listu (v případě kombinací s přípravky na bázi MCPP ) do konce odnožování.
U některých jednotlivých odrůd se může za určitých okolností projevit zvýšená citlivost k přípravku.
Aplikace v **máku**: v máku se přípravek aplikuje preemergentně do 2 dnů po zasetí nebo postemergentně od plného vývinu 6. listu máku. Pro účinnější odplevelení lze provést 1.postřik preemergentně, 2. postřik postemergentně od 6. listu máku. Vyšší dávka před vzejitím, tj. 1,3-1,51/ha se používá jen v suchých oblastech při nedostatku srážek v období po zasetí a na težkých půdách. Postemergentně neaplikovat bezprostředně po dešti, ale až po obnovení voskové vrstvy na povrchu listů.

**Upozornění:**
V případě bílého máku při postemergentní aplikaci nepřekročit jednorázově dávku 1,2 l/ha (v případě potřeby využít dělené dávky ).