




Smáčedlo

TREND® 90

Tekutý smáčivý přípravek ve formě koncentrátu pro ředění vodou k použití v ochraně rostlin.

® reg. ochranná známka E.I.Du Pont de Nemours and Co. (Inc.)

Účinná látka	isodecylalkohol ethoxylat 90 %
 Xi Dráždivý	<p><u>Před každým použitím si vždy přečtěte etiketu!</u> Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Hořlavina III. třídy!</p> <p>R41 – Riziko vážného poškození očí. R52/53 – Škodlivý pro vodní organismy: může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.</p> <p>S2 – Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 – uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S20/21 – Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S25 – Zamezte styku s očima. S26 – Při zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S28 – Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. S35 – Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S36/37/39 – Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.</p>
Výrobce	DuPont de Nemours (France) S.A.S.
Držitel rozhodnutí	DuPont CZ s.r.o. Pekařská 14, 115 00 Praha Tel. 257 414 111
Registrační číslo	4010-1C
Balení	1.25 l HDPE, obsah 1000 ml, lepená etiketa, 10 x 1 l HDPE/karton
Datum výroby/šarže	na obalu
Doba použitelnosti	Dva roky od data výroby při dodržení podmínek skladování v neporušených originálních obalech.
Působení	Trend® 90 zlepšuje smáčivost postřikové kapaliny a umožňuje tak snazší adhezi a penetraci použitých přípravků na ochranu rostlin.
Návod na použití	<p>Trend® 90 (0.1 %) používejte v kombinaci s herbicidními přípravky Titus® 25 WG (kukuřice, brambory), Titus Plus® WG (kukuřice), Grid® (kukuřice), Refine® (kukuřice, louky a pastviny), Arkem® (pšenice, ječmen), Granstar® (obilniny), popř. dalšími, avšak vždy v souladu s doporučením jejich výrobce.</p> <p>Trend® 90 (0.05 %) používejte vždy s přípravkem Safari® (cukrová a krmná řepa).</p>
Příprava postřikové kapaliny	Potřebné množství přípravku se vpraví do nádrže postřikovače naplněné polovičním objemem vody potřebným k postřiku a za stálého míchání se přípravek rozpustí. Pak se přidá potřebné množství smáčedla Trend® a voda se doplní na celkový objem a vše se důkladně promíchá.


label/cz/trend 90 classified (dpd + text imposed by HM nov-04)

revised: april-2005

printed: 6.3.2006

page: 1



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	Při práci s přípravkem použijte ochranné osobní prostředky schválené pro přípravek, s nímž se smáčedlo používá. Při práci nejezte, nepijte ani nekuřte. Před jídlem a vždy po skončení práce se umyjte. Postřik provádějte pouze za bezvětří či mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Postřik nesmí být zanesen na sousední kultury ani přímo zasáhnout vodní toky, příkopy a recipienty povrchových vod. Trend® je hořlavina III. třídy. Eventuelní požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, případně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít pouze výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem, a pouze v těch případech, kdy je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná voda nemůže uniknout z požářiště do okolí, proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a zasáhnout zemědělskou půdu. Pozor! Při požárním zásahu musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických zplodin.
První pomoc	<ul style="list-style-type: none">• Požití: Podejte asi 10 tablet medicínálního uhlí a 0.5 l vlažné vody a dopravte postiženého okamžitě k lékaři. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu• Nadýchání: Zajistěte čerstvý vzduch, klid, chraňte před chladem.• Zasažení pokožky: Odstraňte zasažený oděv, omývejte vodou a mýdlem.• Zasažení očí: Zamezte styku s očima. Vymývejte proudem pitné vody po dobu 15 minut a v případě přetrvávajícího podráždění vyhledejte lékařské ošetření. <p>Při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření, informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze intoxikace konzultovat s toxikologickým informačním centrem v Praze: Toxikologické informační centrum - Klinika nemocí z povolání Vyšehradská 46, 128 21 Praha 2, tel.: 224 919 293</p>
Skladování	Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech, v suchých uzamykatelných skladech, mimo dosah dětí, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, hořlavin, léků, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek při teplotě 5-30 °C. Chraňte před vlhkem, mrazem, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem!
Likvidace obalů a zbytků	<ul style="list-style-type: none">• Zbytky postřikové kapaliny a oplachové vody zřed'te vodou v poměru cca 1:5 a beze zbytku vystříkejte na ošetřovaném pozemku, přičemž nesmějí být zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod.• Prázdné obaly od přípravku 3 x důkladně vypláchněte (oplachovou vodu použijte pro přípravu postřikové kapaliny), znehodnoťte a předejte do sběru k recyklaci nebo spálení ve schválené spalovně.<ul style="list-style-type: none">▪ Obaly od přípravku nepoužívejte k jiných účelům! Případné nepoužitelné zbytky přípravku spalte ve spalovně stejných parametrů jako pro obaly.
Poznámka	Výrobce zaručuje kvalitu přípravku pouze v případě, že je uchováván v originálních uzavřených obalech a neručí za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo nesprávným použitím. Neobvyklé místní půdní a klimatické podmínky a nové odrůdy mohou být příčinou nižší účinnosti přípravku nebo poškození plodiny, za což výrobce neručí.
	
	Packaging disposal/recycling symbols: greenpoint + triangle with arrows (2 inside/ HDPE outside)