

HNOJIVO ES Kapaln  NPK (Mg, S) hnojivo 12,7-3-3 (5-4) s b rem (B), m di (Cu),  elezem (Fe), manganem (Mn), molybdenem (Mo) a zinkem (Zn)

12,7 % (v/v) N	vr. dus�k mo�ovinov�	152 g/l	0,01 % (v/v) B	vr. b�r	0,12 g/l
3,0 % (v/v) P ₂ O ₅	vr. oxid fosfore�n�	36 g/l	0,002 % (v/v) Cu	vr. m�ď v chel�tu s EDTA	0,024 g/l
3,0 % (v/v) K ₂ O	vr. oxid draseln�	36 g/l	0,02 % (v/v) Fe	vr. �ezezo v chel�tu s EDTA	0,24 g/l
5,0 % (v/v) MgO	vr. oxid ho�e�nat�	62 g/l	0,01 % (v/v) Mn	vr. mangan v chel�tu s EDTA	0,12 g/l
4,0 % (v/v) S	vodorozpuatn� s�ra	48 g/l	0,001 % (v/v) Mo	vr. molybden	0,012 g/l
			0,002 % (v/v) Zn	vr. zinek v chel�tu s EDTA	0,024 g/l

V robce: AGRA GROUP a.s.,
Tov rn  9, 387 15 Střelsk  Hoštice, Czech Republic

Obsah balen : 24 kg • 600 kg • 1200 kg (tj. 20 litr  • 500 litr  • 1000 litr )

Podm nky skladov n : Skladujte odd len  od potravin, mimo dosah d t  a v p vodn ch obalech. Doba pou itelnosti: **36 m s c ** od dod vky hnojiva p i dodr zen  podm nek skladov n . Hnojivo skladujte v p vodn m balen , v zastřešen  m stnosti, p i teplot  v hranici **-25 ÷ +30 C**. Maxim ln  mno stv  vrstev p i skladov n : kanystry 20 dm³ - 3 vrstvy • kontejner 1 m³ - 2 vrstvy.

Listov  hnojivo **CAMPOFORT® Forte** se zvy šen  stimula n m u inkem je ur eno zvl st  do intenzivn ch porost  zelenin, ovocn ch v sadeb, chmele, ale i cukrovek a brambor. Vyrovnan  obsah  ivin dopln n  potřebn mi mikroelementy se u intenzivn  p stovan ch plodin projevuje v razn  pozitivn m vlivem na zdravotn  stav rostlin a kvalitu sklizn v ch produkt . Pou iv  se formou mimokořenov  v ţivy postřikem na list rostlin.

Rozsah a zp sob pou it : Hektarov  d vka: **12 kg / ha** (tj. 10 litr  / ha)

P i aplikaci db me t chto z sad:

1. Nepřekra ujeme doporu enou koncentraci  ivn ho roztoku.
2. Nestř k me p i prudk m slunci a vysok ch teplot ch; nejlep   je rann  (po sejit  rosy) nebo pozdn  odpoledn  aplikace, postřik p ed de t m nebo za de t  nen  u inn .
3. Nestř k me porosty fyziologicky  i mechanicky po kozen  nebo siln  napaden  chorobami a  k dci.
4. Nestř k me porosty p ehnojen  dus kem.
5. Na p d ch s n zkou  rodnost  se u inek mimokořenov  v ţivy rostlin nem ţe dostate n  projevit.

Doporu en  aplikace listov ch hnojiv CAMPOFORT® dle AVS (aktu ln  v ţivn  stav rostlin):

Plodina	V�voj. f�ze BBCH (BBa, Eichhorn)	kombinace s	hekt. d�vka hnojiva / optim. mno�stv� vody
obiloviny	25 - 61	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 120 lt. - 300 lt.
řepka, s�ja, hořice	33 - 61	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 120 lt. - 300 lt.
brambory, cukrovka, luskoviny	39 - 75	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 150 lt. - 300 lt.
vinn� r�va	26 - 38	herbicidy, insekticidy	12 kg (10 lt.) CF / 500 lt. - 1000 lt.
chmel, ovocn� plodiny, zelenina	45 - 81	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 400 lt. - 2000 lt.
m�k setv�	16 - 61	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 200 lt. - 300 lt.
slune�nice	31 - 39	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 200 lt. - 300 lt.
kukuřice	18 - 32	herbic., fungic., insektic.	12 kg (10 lt.) CF / 120 lt. - 300 lt.

Obsah rizikov ch prvk  v hnojivu

nepřekra uje limitn  hodnoty stanoven  vyhl skou  . 474/2000 Sb.

(Cd < 1 mg/kg • Pb < 15 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

Pokyny pro bezpe nost a ochranu zdrav  p i pr ci:

P i pr ci s hnojivem je zak z no p t, j st, kouřit. Je t eba dodr ovat z sady osobn  hygieny, po pr ci a p ed j dlem om t poko ku rukou teplou vodou a m dlem a o etřit vhodn m repara n m kr mem.

Prvn  pomoc: P i zasa en  o i: okam it  d kladn  vypl chn te vodou a vyhledejte l kařskou pomoc.

Po it : vyp t bezprostředn  po po it  0,5 l vla n  vody a vyhledat l kaře.

Zasa en  poko ky: rychle opl chnout dostate n m mno stv m vody, pozd ji d kladn , ale bez velk ho mechanick ho dr  d n , om t vodou a m dlem, odlo it zasa en  od v. Ve v sch t   ch p padech, p i po it  nebo zasa en  o i v dy vyhledat l kařskou pomoc.